



# ŠKOLSKO NATJECANJE IZ BIOLOGIJE

## 2025.

### 6. skupina (4. razred SŠ)

Zaporka natjecatelja			
SUDIONIK NATJECANJA U	ZNANJU		
USPJEH NA NATJECANJU	Ukupan mogući broj bodova	Broj postignutih bodova	Postotak rješenosti
<b>40</b>			
<b>Potpisi članova povjerenstva</b>			
1.			
2.			
3.			
Mjesto		Datum	

**Napomena:**

Za rješavanje pisane zadaće imaš na raspolaganju **60 minuta**.

Odgovori se upisuju **isključivo u obrazac za odgovore**. Moraju biti napisani **isključivo plavom kemijskom olovkom**. Oni napisani grafitnom ili kemijskom olovkom koja se može brisati neće se uzimati u obzir pri bodovanju kao ni odgovori koji nisu čitko i jasno napisani.

Odgovori u obrascu **ne smiju** se prepravljati ili brisati korektorom. **Ispravljeni odgovori neće biti vrednovani**.

Za vrijeme pisanja zadaće nije dopuštena uporaba mobitela ni napuštanje prostorije u kojoj se provodi natjecanje.

Pri rješavanju zadataka možeš upotrebljavati prazne prostore u pisanoj zadaći, ali se te bilješke ni rješenja **neće bodovati**. Bodovat će se **isključivo rješenja upisana u obrazac za odgovore**.

**Ukupan broj bodova za pojedini zadatak naznačen je u polju uz svaki zadatak.**

**Ova stranica pisane zadaće pričvršćuje se uz obrazac za odgovore.**

## I. SKUPINA ZADATAKA

**U obrazac za odgovore upiši na odgovarajuće mjesto slovo JEDNOGA točnog odgovora.  
Ako je upisano više odgovora, zadatak NE donosi bodove**

1.	<b>Što je produkt translacije?</b> a) razgranati polisaharid b) nerazgranati lanac aminokiselina c) dvolančana polinukleotidna molekula d) jednolančana polinukleotidna molekula	1. pitanje  <b>1</b>
2.	<b>Koja tvrdnja NIJE točna za molekulu DNA u stanici bakterije <i>Escherichia coli</i>?</b> a) Nalazi se u obliku nukleozida. b) Građena je kao dvostruka uzvojnica. c) To je kružna polimerna makromolekula. d) Građena je od komplementarnih lanaca koji su antiparalelni.	2. pitanje  <b>1</b>
3.	<b>Koja od navedenih molekula NIJE dio strukture tRNA niti je ikada vezana na nju?</b> a) tirozin b) uracil c) deoksiriboza d) fosfatna skupina	3. pitanje  <b>1</b>
4.	<b>U navedenoj DNA sekvenciji 3'-TGT TAA GCC ATA CTC AAA TCG -5', došlo je do promjene koda ATA u ATT. Odredi vrstu mutacije do koje je došlo promjenom koda.</b> a) istoznačna mutacija b) pogrešna mutacija c) besmislena mutacija d) mutacija pomaka okvira čitanja	4. pitanje  <b>1</b>
5.	<b>Koje su moguće krvne grupe djece roditelja od kojih jedan ima krvnu grupu A, a drugi krvnu grupu B?</b> a) krvne grupe A i B b) krvne grupe A, B i AB c) samo krvna grupa AB d) krvne grupe A, B, AB i 0	5. pitanje  <b>1</b>
6.	<b>Kod vinske mušice <i>Drosophila melanogaster</i>, aleli za crvene oči i sivo tijelo dominantni su u odnosu na alele za bijele oči i crno tijelo. Koji bi tip križanja bio prikladan za utvrđivanje jesu li geni vezani?</b> a) Heterozigotne crvenooke ženke križane s crnim mužjacima. b) Heterozigotne crvenooke ženke sivoga tijela križane s bjelookim crnim mužjacima. c) Bjelooke ženke križane s homozigotnim mužjacima sivoga tijela.	6. pitanje  <b>1</b>

	d) Homozigotne crvenooke ženke sivoga tijela križane s bjelookim, crnim mužjacima.	
--	--	--

## II. SKUPINA ZADATAKA

***U obrazac za odgovore upiši slova DVAJU točnih odgovora. Djelomično točno riješen zadatak također donosi bodove. Ako je upisano više od dva odgovora, zadatak NE donosi bodove***

7.	<p>Križani su crni kratkodlaki zamorci, heterozigoti za oba svojstva. Njihovi su potomci crni kratkodlaki, crni dugodlaki, bijeli kratkodlaki i bijeli dugodlaki u omjeru 9 : 3 : 3 : 1.</p> <p>Koji će od navedenih parova roditelja, dobivenih navedenim križanjem, imati potomke u fenotipskom omjeru 1 : 1 : 1 : 1?</p> <p>Slovom B/b u zadatku označen je gen za boju dlake, a slovom S/s gen za duljinu dlake.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zamorci su drugoga križanja crn, kratkodlak × bijel, dugodlak</li> <li>b) zamorci su drugoga križanja crn, kratkodlak × crn, dugodlak</li> <li>c) zamorci su drugoga križanja BbSs × bbss</li> <li>d) zamorci su drugoga križanja bbSS × BBss</li> <li>e) zamorci su drugoga križanja BBSs × BbSS</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">7. pitanje</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">2</td></tr> </table>	7. pitanje	2
7. pitanje				
2				

8.	<p>Koju posljedicu na razvoj ploda može imati nerazdvajanje triju homolognih parova kromosoma tijekom spermatogeneze?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) poliploidiju ploda</li> <li>b) aneuploidiju ploda</li> <li>c) translokaciju kod ploda</li> <li>d) letalnost ploda</li> <li>e) trisomiju, ali ne i monosomiju ploda</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">8. pitanje</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">2</td></tr> </table>	8. pitanje	2
8. pitanje				
2				

9.	<p>Kod vinske mušice siva boja tijela (b+) dominantna je u odnosu na crnu boju tijela (b), a normalna krila (vg+) dominantna su u odnosu na zakržljala krila (vg). Homozigotne muške mušice zakržljalih krila i crnoga tijela križane su sa ženkama koje su heterozigoti za obje osobine. Prebrojeno je 2104 jedinka fenotipa:</p> <p style="margin-left: 40px;">904 mušica normalnih krila i sivoga tijela                    890 mušica zakržljalih krila i crnoga tijela                    145 mušica zakržljalih krila i sivoga tijela                    165 mušica normalnih krila i crnoga tijela</p> <p><b>Koje su tvrdnje točne za navedeno križanje?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Predviđeni fenotipski omjer bio je 9 : 3 : 3 : 1.</li> <li>b) Postoji nezavisno odvajanje alela za dva promatrana svojstva.</li> <li>c) Ako postoji nezavisno odvajanje alela za navedena svojstva, očekivani je broj mušica zakržljalih krila i sivoga tijela 526.</li> <li>d) Praćene osobine nalaze se na različitim kromosomima.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">9. pitanje</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">2</td></tr> </table>	9. pitanje	2
9. pitanje				
2				


e) Udaljenost je između tih gena 14,7 cM.

### III. SKUPINA ZADATAKA

**Odredi točnost tvrdnja. Ako je tvrdnja točna, upiši redoslijedno na odgovarajuće mjesto u obrascu za odgovore slovo T, a ako nije točna, slovo N. Ako je uz istu tvrdnju upisano i slovo T i slovo N, zadatak NE donosi bodove. Djelomično točno riješen zadatak također donosi bodove.**

Slika prikazuje kariogram sisavca. Prouči sliku i odredi točnosti sljedećih tvrdnja.

10. pitanje  
3



10.

10.1. Slika prikazuje kariogram mužjaka.

10.2. Slika prikazuje kariogram čovjeka.

10.3. Broj kromosoma u kariogramu možemo zapisati kao  $n = 14 + XXY$ .

10.4. Broj kromosoma u kariogramu možemo zapisati kao  $2n = 31, XXY$ .

10.5. Iz kariograma se može iščitati aneuploidija spolnih kromosoma.

	<p><b>Rodoslovje prikazuje nasljeđivanje Duaneova sindroma (DS) u tri generacije. Duaneov sindrom kongenitalni je poremećaj očnoga motiliteta, stanja uzrokovanih dominantnim alelom koji utječe na poravnanje očiju.</b></p>	<p>11. pitanje 3</p>
11.	<p>(Izvor: Yang, M.-M., Ho, M. et al., 2013. Pedigree of a Chinese family with Duane retraction syndrome. [diagram online] Available at: <a href="https://www.researchgate.net/figure/Pedigree-of-a-Chinese-family-with-Duane-retraction-syndrome-.Squares-men-circles_fig1_236921765">https://www.researchgate.net/figure/Pedigree-of-a-Chinese-family-with-Duane-retraction-syndrome-.Squares-men-circles_fig1_236921765</a> (pristupljeno 28. prosinca 2024). Public domain.)</p> <p>11.1. Vjerovatnost je da treće dijete supružnika I:1 i I:2 ima Duaneov sindrom 50 %.      11.2. Vjerovatnost je da treće dijete supružnika II:1 i II:2 ima Duaneov sindrom 100 %.      11.3. Vjerovatnost nasljeđivanja bolesti manja je za ženski spol.      11.4. Osoba I:2 je žena, heterozigot za navedeno svojstvo.      11.5. Muškarci s Duaneovim sindromom u ovoj su obitelji heterozigoti.</p>	

#### IV. SKUPINA ZADATAKA


**Poveži pojmove lijevoga i desnoga stupca tako da u obrazac za odgovore ispod svakoga slova koje označava pojam iz lijevoga stupca upišeš JEDAN odgovarajući broj iz desnoga stupca. Dva su ponuđena odgovora u desnome stupcu SUVIŠNA. Djelomično točno riješen zadatak također donosi bodove.**

	<p>Pojedinim područjima biologije pridruži opise istraživanja.</p>	<p>12. pitanje 2</p>
12.	<p>A) klasična genetika          B) molekularna genetika          C) populacijska genetika          D) evolucijska genetika</p> <p>1. uzgoj čistokrvnih pomeranaca          2. učestalost hemofilije među stanovnicima jednoga otoka          3. praćenje utjecaja temperature na potencijal razmnožavanja vinske mušice          4. proučavanje regulacije ekspresije gena          5. usporedba fenotipa i genotipa čimpanze i gorile          6. praćenje sinteze i transporta inzulina u organizmu</p>	

	<p>U procesu replikacije sudjeluju navedeni enzimi. Odredi njihovu ulogu .</p>	<p>13. pitanje 2</p>
13.	<p>A) primaza          B) DNA-polimeraza I          C) DNA-polimeraza III          D) DNA-helikaza          E) DNA-ligaza</p> <p>1. zamjenjuje početnicu deoksiribonukleotidima          2. kida vodikove veze unutar molekule DNA          3. popravlja redoslijed nukleotida u molekuli DNA          4. stvara kratak slijed ribonukleotida          5. povezuje Okazakijeve fragmente          6. sprječava spiralizaciju molekule DNA          7. dodaje ribonukleotide na rastući lanac</p>	

## V. SKUPINA ZADATAKA

**U sljedećim zadatcima pažljivo pročitaj uvodni tekst, promotri priložene slike, sheme ili grafičke prikaze te odgovore na postavljena pitanja upiši u obrazac za odgovore. Broj bodova naveden je uz svaki zadatak. Djelomično točno riješen zadatak također donosi bodove.**

	<p>Slika prikazuje kromosome u stanici tijekom mejoze. Prouči sliku i odgovori na pitanja.</p> 	<p>14. pitanje 4,5</p>
14.	<p>14.1. Kako je građena struktura označena slovom A?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Građena je od celuloznih niti.</li><li>b) Građena je od četiriju slojeva fosfolipida.</li><li>c) Građena je od dvostrukoga sloja proteina</li><li>d) Građena je od dvostrukoga sloja fosfolipida.</li></ul> <p>14.2. Kakav je i koliki broj kromosoma s kojim je stanica ušla u II. mejotičku diobu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <math>n = 12</math></li><li>b) <math>2n = 12</math></li><li>c) <math>n = 6</math></li><li>d) <math>2n = 6</math></li></ul> <p>14.3. Koja je tvrdnja točna za stanicu u metafazi I?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) sadržava po 6 bivalenata na svakome polu</li><li>b) ima 24 lanca DNA koji su nepravilno raspoređeni u stanci</li><li>c) ima ukupno 12 kromosoma koji su maksimalno kondenzirani</li><li>d) ima 12 parova kromosoma smještenih u ekvatorskoj ravnini</li></ul> <p>14.4. Koliko se molekula DNA nalazi u stanci na kraju mejoze?</p>	

**Velika zievalica (*Antirrhinum majus* L.) biljka je čiji cvjetovi u jednom varijetu dolaze u tri različite boje: crvenoj, bijeloj i ružičastoj. Križanjem jedinke ružičastih cvjetova s jedinkom bijelih cvjetova dobiveno je 23 jedinke zievalica ružičastoga cvijeta i 20 jedinka zievalica bijelog cvijeta.**

15. pitanje  
7


**15.**


- 15.1. U tablici na obrascu za odgovore odgovarajućim simbolima prikaži križanje nastalo samooplođnjom:  
 A) jedinka zievalice bijelih cvjetova  
 B) jedinka zievalica ružičastih cvjetova.
- 15.2. U tablicu na obrascu za odgovore upiši genotipski omjer potomaka nastalih nakon samooplođnje.
- 15.3. U tablicu na obrascu za odgovore upiši fenotipski omjer potomaka nastalih nakon samooplođnje.

**Slike prikazuju procese TRANSKRIPCIJE i TRANSLACIJE. U pravokutnike na slikama na obrascu za odgovore upiši odgovarajuće pojmove koji se nalaze u tablici. Isti pojam moguće je upotrijebiti više puta.**

16. pitanje  
4

**16.**



	<p><b>Pozorno prouči prikaze faza stanične diobe jedne stanice Ijljana. Imenuj svaku brojem označenu fazu sa slike.</b></p>	<table border="1"> <tr> <td>17. pitanje</td></tr> <tr> <td><b>2,5</b></td></tr> </table>	17. pitanje	<b>2,5</b>
17. pitanje				
<b>2,5</b>				
17.	 <p>The image contains five micrographs labeled 1 through 5, showing different stages of cell division:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>1:</b> Metaphase I of meiosis, showing four pairs of chromosomes (homologous chromosomes) aligned at the equatorial plate.</li> <li><b>2:</b> Anaphase I of meiosis, showing the separation of homologous chromosomes moving toward opposite poles.</li> <li><b>3:</b> Metaphase II of meiosis, showing four single chromosomes (nucleolus-free) aligned at the equatorial plate.</li> <li><b>4:</b> Anaphase II of meiosis, showing the separation of sister chromatids moving toward opposite poles.</li> <li><b>5:</b> Telophase II of meiosis, showing four daughter cells, each with a single nucleus.</li> </ul>			

(Prilagođeno s :Bailey, Regina. "Overview of the Stages of cell division ." ThoughtCo, Apr. 5, 2023, thoughtco.com/stages-of-meiosis-373512.

#### **Prilog 1; Tablica s kodonima**

